


BULETIN DE AVERTIZARE NR.13

Pentru prevenirea și combaterea organismului daunator: CYDALIMA PERSPECTALIS (OMIDA PAROASA A BUXUSULUI)

OMIDA PAROSA A BUXUSULUI



Se recomandă efectuarea tratamentelor la (cultura) BUXUSULUI cu:

1. KARATE ZEON-0,015% (omizi defoliatoare) sau
2. BACTOSPEINE DF-0,1-0,2 kg/ha (omizi defoliatoare)

Alte produse de protecția plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Măsuri alternative de combatere: mecanice, fizice, biologice

Metodele durabile: biologice, fizice, mecanice și alte metode nechimice trebuie preferate metodelor chimice, dacă acestea asigură un control corespunzător al organismelor daunătoare.

Alte recomandări:

OMIDA PAROSA A BUXUSULUI

Larvele (omida paroasă) care atacă speciile de buxus, au culoare verde cu linii și puncte longitudinale negre și perisori de-a lungul corpului. Larvele se hrănesc cu frunze, producând uneori chiar defolierea totală, conducând la uscarea și pierderea plantei. Devorează masiv din interiorul plantei spre exterior, iar acest mod face ca semnele atacului să nu fie observate și intervenția să fie uneori tardivă, cum a fost și în cazul meu. Larvele mici se hrănesc cu partea superioară a frunzei, iar larvele mari mănâncă complet frunzele, ambele cazuri conducând la uscarea plantei.

Perioada optimă de tratament: La depistarea larvelor

- Al doilea tratament se aplică la interval de 7-10 zile;

- Efectuarea tratamentului fitosanitar după o igienă culturală (taierea și îndepărtarea crengilor uscate, debile, purtătoare de coconi de iernare);

- Tratamentul se execută la temperatura de 6-8 grade Celsius și fără vânt sau nu mai mare de 4m/secundă;

Recomandări: În zonele urbane aliniamente stradale (garduri vii), parcuri, grădini publice se vor respecta următoarele măsuri:

- evitarea staționării și parcării mijloacelor de transport în zona de aplicare a tratamentelor
- interzicerea accesului pietonal în zona

respectarea recomandărilor de mai sus în vederea desfășurării în bune condițiuni a tratamentului și evitarea expunerii trecătorilor la acțiunea ppp-urilor.

Verificați, cu mare atenție recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecția plantelor!

Luati măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!

Respectați cu strictă normele de lucru cu produse de protecția plantelor, normele de protecție și securitatea muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu legea nr.383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr.127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii Alimentării și Turismului nr.15b/3404/1991 al Dep. pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr.328432/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor).

Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecția plantelor.

Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, al ministrului mediului, apelor si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr.352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania, cu modificarile ulterioare.

Toti utilizatorii de PPP (prestatorii, fermierii) sunt obligati sa respecte conditiile de ecoconditionalitate produselor utilizate pe o perioada de cel putin 3 ani!

Se va respecta de catre toti utilizatorii de PPP Ghidul pentru utilizarea in siguranta a Produselor de Protectia Plantelor /2016 postat pe site: <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>, elaborat de MADR-Autoritatea Nationala Fitosanitara.

Conform HG.1230/2012 art.3 alineatul 2, nerespectarea de catre utilizatorii profesioniști a prevederilor art. 67, alin. 1 din Reg. (CE) nr. 1107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel puțin 3 ani a PPP pe care le utilizeaza se sancționeaza cu amenda de la 8.000 la 10.000 lei.

Nume si prenume fermier/Societate comerciala-----
 Domiciliu Fermier/sediusocial SC(Comuna, judet)-----

Ferma(nume/numar,adresa)-----

REGISTRUL de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării i/ fenofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, pre-numele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a data în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/ dăunător i/ buruieni	Denumir e Ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Supra - fața ha	Cantită ți utilizat e (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau a administratorului societății.

COORDONATOR,

DANCIU IULIANA



Responsabil Prognoza si Avertizare,
 Draganeanu Elisabeta

BULETIN DE AVERTIZARE NR.14

Pentru prevenirea si combaterea organismelor daunatoare:**FOCUL BACTERIAN AL ROZACEELOR (ERWINIA AMYLOVORA).**



Se recomanda efectuarea tratamentelor la **MAR, PAR, GUTUI** cu:

1. ALCUPRAL 50 PU-0,2%(mar- prefloral)
-0,3%(par,gutui)sau
2. BOUILLIE BORDELAISE WDG-7,5 kg(mar,par- prefloral) sau
3. CHAMP 77 WG- 0,2% (mar- prefloral)sau
4. CUPROXAT FLOWABLE-0,35% (mar-prefloral)sau
5. FUNGURAN OH 50 WP-0,3%(gutui -prefloral)
-0,2%(mar-prefloral)sau
6. KOCIDE 2000-0,25%(mar,par-prefloral) sau
7. ALIETTE 80 WG-0,3%(mar,par,gutui)sau
8. TRIUMF 40 WG-2,0-2,5 kg/ha(mar,par,gutui)

Alte produse de protectia plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriu Romaniei.

Masuri alternative de combatere: mecanice, fizice, biologice

Metodele durabile: biologice, fizice, mecanice si alte metode nechimice trebuie preferate metodelor chimice, daca acestea asigura un control corespunzator al organismelor daunatoare.

Alte recomandari:

Tratamentul de aplica la PED cand 3-10% din pomi sunt afectati de focul bacterian.

FOCUL BACTERIAN:

- Primele semne apar la in florit, florile abia "fecundate" se ofilesc si se usuca -capata o culoare bruna negricioasa
- De la floare bacteria trece pe lastari care se ofilesc si capata o culoare bruna, pe acestia aparand scurgeri de exudat bacterian
- Fructele mici capata o culoare neagra- bruna. Pe fructele mari apar pete negre sau brune si exudat bacterian.
- Pomi atacati de focul bacterian arata ca si cum ar fi parjoliti de foc. Bacteria poate conduce la uscare livezilor in doar cateva luni.

Atentie !

In vederea impiedicarii transmiterii agentilor patogeni se recomanda ca in prealabil sa se execute igiena culturala a pomilor pentru distrugerea principalelor forme de iernare a ciupercilor.

Mentionam ca produsele Alcupral 50 PU, Funguran OH 50 WP si Cuproxat Flowable au actiune preventiva pentru rapan si monilioza la mar si par, reducand astfel posibilitatea transmiterii bolii.

Verificati, cu mare atentie recomandariile cu privire la compatibilitatea produselor atunci cand intentionati sa aplicati amestecuri de produse de protectia plantelor!

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

Respectati cu strictete normele de lucru cu produse de protectia plantelor, normele de protectie si securitatea muncii, de protectie a albinelor si a animalelor in conformitate cu legea nr.383/2013 a apiculturii, cu modificarile si completariile ulterioare si Ordinul nr.127/1991 al ACA din Romania, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii Alimentatiei 15b/3404/1991 al Dep. pentru Administratie Locala si 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum si cu Protocolul de colaborare nr.328432/2015, incheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor).

Respectati prevederile Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr.297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectia plantelor.

Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, al ministrului mediului, apelor si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr.352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania, cu modificarile ulterioare.

Toti utilizatorii de PPP (prestatorii, fermierii) sunt obligati sa respecte conditiile de ecoconditionalitate - SMR 10. Acestia au obligatia sa detina registrul privind evidenta tratamentelor si sa tina evidenta contabila a produselor utilizate pe o perioada de cel putin 3 ani!

Se va respecta de catre toti utilizatorii de PPP Ghidul pentru utilizarea in siguranta a Produselor de Protectia Plantelor /2016 postat pe site: <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>, elaborat de MADR-Autoritatea Nationala Fitosanitara. Conform HG.1230/2012 art.3 aliniatul 2, catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art. 67, alin. 1 din Reg. (CE) nr. 1107/2009 nerespectarea de Conform Reg.CE nr. 1107/2009, art. 67, (1) Producătorul agricol numerează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel puțin 3 ani a PPP pe care le utilizeaza se sanctioneaza cu amenda de la 8.000 la 10.000 lei.

Nume și prenume fermier / Societate comerciala-----
 Domiciliu fermier/sediu social SC(Comuna, judet)-----
 Ferma (nume/numar, adresa)-----

REGISTRUL de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratament. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării/ fenofaza culturii	Tratamentul efectuat				Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a data în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/ dăunătorii/ buruieni	Denumire ppp folosit	Doza Omologată/ doza folosită	Suprafața ha			

Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1) - producătorul agricol numerează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau a administratorului societății.

COORDONATOR,
DANCIU IULIANA



Responsabil Prognoza și Avertizare,

Draganeanu Elisabeta