MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR DOLJ

B-dul Nicolae Romanescu nr. 39D Craiova, Jud. Dolj
Telefon/fax: 0251.448191

CRAIOVA
Nr. 734 / 22.06.2018

**Buletin de avertizare nr. 66**

Conditiile climatice din ultimile zile au favorizat aparitia agentilor patogeni **in plantatiile de pruni**: **VIERMELE PRUNELOR GII (CYDIA F.), PATAREA FRUNZELOR (POLYSTIGMA R), MONILIOZA (MONILINIA L), CIURUIREA (CORYNEUM B.), TAPHRINA (TAPHRINA P).**
Se recomanda efectuarea de tratamente chimice cu urmatoarele produse de protectia plantelor:

| | Denumirea PPP | Agentul de daunare combatut | Doza recomandata l,kg, % /ha | Observatii |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRAVO 500 SC<br><br>DECIS MEGA 50 EW | Monilioza, patarea rosie a frunzelor<br><br>Viermele prunelor | 0,15%<br><br>0,003% | Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta. |
| 2 | DITHANE M 45+<br>FOLICUR SOLO 250EW<br>+<br>CORAGEN | Patarea rosie a funzelor<br>Monilioza<br><br>Viermele prunelor | 0,2%<br>0,075-0,1%<br><br>0,01% | Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta. |
| 3 | TELDOR 500 SC +<br>ALCUPRAL 50 PU +<br><br>KAISO SORBIE 5 EG (LAMDEX NEO) | Monilioza<br>patarea rosie a funzelor, monilioza, ciuruirea frunzelor<br>Viermele prunelor | 0,05%<br>0,2%<br><br>0,015% | Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta. |
| 4 | FOLPAN 80 WDG +<br>SIGNUM<br>DECIS MEGA 50 EW | Ciuruirea, patarea rosie a funzelor<br>Monilioza<br>Viermele prunelor | 0,2%<br>0.5 kg<br>0,15 l | Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta. |
| 5 | TOPSIN 70 WDG +<br><br>CALYPSO 480SC | Monilioza, patarea rosie a funzelor<br><br>Viermele prunelor | 0,07%<br><br>0,02% | Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta. |
| 6 | DELAN 700WDG +<br><br>KARATE ZEON | Patarea rosie a funzelor<br><br>Viermele prunelor | 0,035-0,05%<br><br>0,015% | Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta. |

Aplicarea tratamentelor chimice se face la pragul economic de daunare:

| | | |
|---|---|---|
| Patarea frunzelor | 10-25% | - frunze - GA |
| Monilioza | 3-10% | - fructe - GA |
| Ciuruirea | 5-15% | - frunze - GA |
| Taphrina | 3-10% | - fructe - GA |

***Metode profilactice de combatere*:**
Viermele prunelor ataca in special soiurile de prun. In prima generatie larvele ataca samburii fructelor verzi, care nu se mai dezvolta, iar la generatia a II-a si a III-a ataca fructele intrate in parga si cele coapte formand caverne in jurul samburelui din care cauza ele se coc si cad de timpuriu.
Pentru reducerea rezervei biologice a daunatorului se recomanda efectuarea unor lucrari culturale: instalarea de braie capcana in jurul tulpinii pomilor, pentru capturarea larvelor in timpul deplasarii si arderea acestora, strangerea fructelor viermanoase si distrugerea lor.

Inainte de utilizarea instalatiei de aplicat ppp, verificati daca aceasta corespunde din punct de vedere tehnic. Deasemenea, instruiti operatorul pe linie de utilizare a ppp si intocmiti procese verbale.

Se vor utiliza numai produse de protectia plantelor omologate de Comisia Nationala de Omologare a Produselor de Protectia Plantelor, care se gasesc in baza de date PEST-EXPERT.

***Pentru Primarii:AFISATI LA LOC VIZIBIL BULETINELE DE AVERTIZARE.***
Sa vor lua masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

Respectati cu strictete normele de lucru cu PPP, normele de protectie si securitatea muncii, de protectie a albinelor si animalelor, in conformitate cu legea nr. 383/2013 a apiculturii si cu ordinul nr.127/1991 al ACA din Romania; Ordinul comun Nr 45/1991 al MMA, Ordinul 68/1992 al MMA; 15b/3404/1991 al Dep. Admin. Locala si 1786/TB/1991 al ministerului transporturilor, precum si cu Protocolul de Colaborare nr. 328432/2015,CU acaSI NR.3242/103/21.10.2016 cu ROMAPIS, privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor.

*Atentie ! In perioada aceasta sunt inflorite unele specii melifere ( floarea soarelui, mazariche, coriandru, sparceta, lucerna, otetar fals).*

**Pentru prevenirea intoxicatiilor la albine, detinatorii de suprafete agricole si silvice (fermieri/producatori agricoli) sunt obigati sa anunte in scris consiliile locale /primariile cu cel putin 48 de ore inainte de efectuarea tratamentului, locul, data, durata tratamentului, denumirea produsului folosit, metoda de aplicare (prafuire, stropire, aerosoli).**

**Toti utilizatorii de PPP (prestatori, fermieri) sunt obligati sa respecte conditiile de ecoconditionalitate - SMR 10. Acestia au obligatia sa detina registrul privind evidenta tratamentelor si sa tina evidenta contabila a produselor utilizate pe o perioada de cel putin 3 ani!**

Se va respecta de catre toti utilizatorii de PPP Ghidul pentru utilizarea in siguranta a Produselor de Protectia Plantelor /2016 postat pe site: http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html, elaborat de MADR-Autoritatea Nationala Fitosanitara.

Conform HG.1230/2012 art.3 aliniatul 2, nerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art. 67, alin. 1 din Reg. (CE) nr. 1107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel putin 3 ani a PPP pe care le utilizeaza se sanctioneaza cu amenda de la 8.000 la 10.000 lei. Evidenta se va tine intrun registru conform modelului de mai jos:

Nume si prenume fermier/Societate comerciala----------
Domiciliu Fermier/sediusocial SC(Comuna, judet)----------
Ferma(nume/numar,adresa)----------

## REGISTRUL de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor

| Data efectuării tratam. (ziua luna, anul) | Cultura şi locul unde este situat terenul | Timpul aplicării / fenofaza culturii | Tratamentul efectuat | | | | | Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura | Data începerii recoltării produsului agricol | Nr. si data document prin care s-a data în consum populaţiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Agentul de dăunare: boli/ dăunători/ buruieni | Denumire Ppp folosit | Doza omologată /doza folosită | Supra-faţa ha | Cantităţi utilizate (kg, l) | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menţionează câte pagini conţine registrul, purtând semnătura (şi ştampila, după caz) fermierului sau a administratorului societăţii.

AUTORITATEA NAŢIONALĂ FITOSANITARĂ ROMÂNIA
Oficiul Fitosanitar DOLJ

**Coordonator,**
**Dr. Ing. OANA MARIA**

**Consilier,**
Naidin Cornel